Notas sobre lepidópteros ibéricos

Novedades que no lo son

POR EL

P. Ambrosio Fernández, O. S. A.

En esta Revista apareció hace poco más de un año un trabajo de H. Zerny que tiene por título «Die Lepidopterenfauna von Albarracin in Aragonien» [1], en el cual se citan algunas especies de mariposas nuevas para la fauna peninsular, y otras, bastantes más, igualmente nuevas para la fauna aragonesa.

Pues bien, muchas de las especies que Zerny señala como novedad descubierta por él, o por Wagner, Predota y Schwingenschuss, colegas suyos de exploración de la zona de Albarracín, no son tal novedad. Como que hace nada menos que diez años que las dí yo a conocer incorporándolas a los dominios de la fauna española en un pequeño estudio que presenté al Congreso que la Asociación para el Progreso de las Ciencias celebró en Bilbao el año 1919, trabajo que la misma Asociación publicó luego por su cuenta con el título de «Catálogo de los macrolepidópteros heteróceros de España, por el P. Ambrosio Fernández», llevando al frente la fecha de 9 de septiembre de 1919. No incluí en este catálogo el grupo de los geométridos, que de haber figurado en él, habría disminuído bastante más el número de las novedades apuntadas en el estudio de Zerny.

He aquí ahora, citadas al azar, según las voy viendo, algunas—no todas quizás—de las especies que en el referido trabajo se dan como nuevas para España, pero que son en realidad ya conocidas para la fauna española, según puede verse en mi Catálogo.

Chariclea delphinii L.

Es nueva para la fauna peninsular, según Zerny (pág. 389). En mi Catálogo se dice que ha sido cazada en Uclés (Cuenca), y se añade to-

[1] Publicado en Eos t. III, cuadernos 3.° y 4.°

davía lo siguiente: «Sumamente rara, tanto, que a pesar del especial interés que he puesto en su captura, no he cazado más que dos ejemplares, uno de los cuales figura en la colección Pujol» (pág. 132).

Orthosia (Amathes) witzenmanni Stdf.

La presenta Zerny como conocida solamente de Francia meridional, de Argelia y de Cataluña; mi Catálogo la cita de Uclés y de Vellisca (Cuenca), y dice que es rara la forma típica y que existen además de ella las formas *subcastanea* Stgr. y *plumbina* Tur., las cuales son poco frecuentes y se encuentran: la primera en las dos localidades citadas, y la segunda solamente en Vellisca (pág. 125).

Dyschorista fissipuncta Hw.

Nueva para la península, según Zerny (pág. 383). Mi Catálogo de hace diez años, tiene esto en la página 127: «*Sidemia* (*Dyschorista*) *fissipuncta* Haw.—Uclés, Vellisca. Rara». Y además de citar la forma típica, lo mismo que en el caso anterior, añade la ab. *conjuncta* War., existente y cazada en Vellisca.

Mamestra (Polia) cappa Hbn.

Zerny escribe que en la península sólo era conocida hasta ahora de Cataluña. Así sería, si no la hubiera yo citado en 1919 de Uclés y Vellisca. Véase el Catálogo, página 116. La consideraba yo entonces como muy rara, ahora no la tengo por tanto.

Hadena (Heteromma) alpigena B.

Entiende nuestro autor que nadie sabe que se halle más que en Francia meridional, en Andalucía y en Argelia; pero si hubiera leído mi Catálogo, habría topado en él con estas palabras: «*Heteromma al-*

pigena Bsd.—Uclés. Rara. En el mes de mayo. El macho, que apenas era conocido, es muy semejante a la hembra, pero más claro. Una interesante novedad para la fauna española» (pág. 127). Por donde verá Zerny que no sólo había sido encontrada en Castilla antes de ahora, sino que ya entonces se dieron detalles acerca del macho, tan desconocido hasta aquella fecha, que en la obra de Seitz, Warren se limita a describir la hembra. Zerny dice que ha sido cazada en el mes de junio; yo siempre la he encontrado en mayo. A. Bang-Haas, de Blasewitz, quizás tenga todavía alguno de los ejemplares que le remití en el año 1915, si no recuerdo mal.

Cleophana anarrhini Dup.

Zerny no sabe que haya sido encontrada en otras partes que en el Sur de Francia y en Murcia. Habría salido de su error consultando el Catálogo, que cita unas cuantas localidades españolas: Uclés, Vellisca, Cataluña, Andalucía, no siendo rara en ninguno de estos parajes (página 120).

Rhegmatophila alpina Bell.

Esta especie no era conocida, según Zerny, más que de Digne (Francia), y es por lo tanto una gratísima novedad descubierta en España por él y los otros cazadores de Albarracín, Weiss, Predota, etc. Pero no lo es, puesto que mi Catálogo la cita en la página 103, como existente en Teruel.

Estos defectos y alguna que otra afirmación un poco extraña, como la de dudar de que el piérido *Euchloe belemia* Esp. haya sido visto jamás en el centro y mucho menos en el Norte de la península (ha sido encontrado repetidas veces en Valladolid y hasta en Galicia...), no impiden que el estudio de H. Zerny sobre los lepidópteros de Albarracín sea de verdadero mérito y revele una competencia nada común en la especialidad a que se refiere.

Salamanca, 2-VII-1929.